

# Viruela símica o monkeypox

Conoce los periodos de incubación, manifestación de síntomas y periodo de aislamiento.

Periodo de incubación

**1 a 2 semanas**

luego de la exposición al virus.  
Aunque puede extenderse a

**21 días**



Los primeros síntomas se parecen a la influenza: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos o agotamiento

Sarpullido o erupciones comienzan usualmente entre

**1 a 3 días**

del inicio de estos síntomas

El sarpullido o las erupciones podrían estar localizados en las manos, los pies, el pecho, la cara, y en o cerca o dentro de la boca, la vagina y el ano.

Duración de los síntomas

**14 a 21 días**

usualmente se resuelven por sí mismos.

Periodo de aislamiento

**2 a 4 semanas**

o hasta que se hayan sanado las lesiones y una capa de piel se haya formado.



Viruela símica  
**2 etapas**



**Periodo de invasión**

La primera etapa ocurre entre los **días 0 al 5**

Caracterizado por: fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, dolor de espalda, nódulos linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Los nódulos linfáticos pueden inflamarse en el cuello (submandibulares y cervicales), las axilas (axilares) o la ingle (inguinales) y aparecer en ambos lados del cuerpo o sólo en uno.



**Periodo de erupción cutánea**

La segunda etapa suele ocurrir entre **1 a 3 días**

después del inicio de la fiebre. Caracterizada por: erupciones en la piel.


Generalmente, se afecta primero el rostro y se extiende al resto del cuerpo.



Erupciones en la piel pasa por

**4 etapas**

**macular, papular, vesicular y pustular.**  
Luego, finalmente, se forman costras.



Las costras se producen en

**10 días**

Su eliminación completa puede tardar hasta **3 semanas**

**Estigmatizar personas por su estatus de salud no es correcto. Cualquier persona puede enfermarse con la viruela símica.**