



## Proceso para Interpretar los Resultados de la Prueba de Tuberculina

La interpretación de la prueba de tuberculina depende de la medida de la induración en la piel de una persona y su riesgo de infectarse con TB o de desarrollar la enfermedad activa de TB si se infectara. La interpretación de la prueba se debe llevar a cabo por un enfermero graduado o médico debidamente adiestrado.

- Identifique los factores de riesgo del paciente, si alguno, en la tabla a continuación. Compare el tamaño de la induración del paciente con lo estipulado en la tabla para que su resultado se considere positivo.
- Siempre documente el resultado de la prueba en milímetros (mm). No escriba negativo o positivo. En vez, documente 00mm, 7mm, 12mm, etc.
- Dele al paciente una copia oficial de sus resultados.
- Si el paciente tiene un resultado positivo, asegúrese que el paciente recibe los referidos necesarios para descartar enfermedad activa de TB.

| Induración $\geq$ 5 mm<br>Considerada Positiva En...  | Induración $\geq$ 10 mm<br>Considerada Positiva En ...  | Induración $\geq$ 15 mm<br>Considerada Positiva En...   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personas infectadas con VIH</li> <li>▪ Contactos recientes de personas con TB activa</li> <li>▪ Personas con cambios fibróticos en radiografías de pecho consistentes con TB previa</li> <li>▪ Pacientes con trasplantes de órganos y otros pacientes inmunosuprimidos (incluyendo pacientes tomando tratamientos prolongados de corticosteroides o antagonistas de TNF-alfa orales o intravenosos)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personas que han emigrado recientemente (últimos 5 años) de países o regiones con alta incidencia de TB</li> <li>▪ Usuarios de drogas inyectables</li> <li>▪ Empleados y residentes de lugares congregadas de alto riesgo (incluyendo prisiones, hospitales, hogares, y albergues)</li> <li>▪ Personal de laboratorios de micobacterias</li> <li>▪ Personas con ciertas condiciones médicas que los ponen en mayor riesgo de progresar a TB activa, incluyendo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silicosis</li> <li>- Diabetes mellitus</li> <li>- Fallo renal crónico</li> <li>- Ciertos tipos de cáncer (ej. leucemia, linfomas, o cáncer de cuello, pulmón o cabeza)</li> <li>- Peso por debajo de 10% de peso ideal</li> <li>- Gastrectomía o bypass yeyuno-ileal</li> </ul> </li> <li>▪ Niños menores de 4 años</li> <li>▪ Infantes, niños y adolescentes expuestos a adultos en categorías de alto riesgo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personas sin factores de riesgo conocidos</li> </ul> |

## **¿Tiene alguna pregunta relacionada a la prueba de tuberculina, un diagnóstico de TB o el tratamiento adecuado para un paciente?**

Ofrecemos consultoría clínica libre de costo.

Llame a nuestra oficina central al 787-765-2929 ext.3861 durante horas laborables. O llame a la línea 24/7 del Southeastern National TB Center al 1-800-4TB-INFO (tienen personas que hablan español).

## **¿Tiene un paciente con sospecha de tuberculosis o un cliente con una prueba de tuberculina positiva?**

Recuerde que por ley todos los profesionales de salud son responsables de notificar casos sospechosos o confirmados de TB, y pruebas de tuberculinas positivas. Para recibir más información llame a nuestra oficina central, al 787-765-2929, ext. 3861 o visite nuestra página electrónica: [www.salud.gov.pr](http://www.salud.gov.pr).