GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Salud

ITINERARIO DE VACUNACION 2020 PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD

VACUNA	BIRTH	1 MES	2 MESES	4 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	19-23 MESES	2-3 AÑOS	4-6 AÑOS	7-10 AÑOS	11-12 AÑOS	13-15 AÑOS	16 AÑOS	17-18 AÑOS
Hepatitis B (Hep. B)	1 dosis	◄---2da dosis----►			◄----------3ra dosis ----------►												
Rotavirus (RV) RV1 (Serie 2 dosis) RV5 (Serie 3 dosis)			1ra dosis	2da dosis	Ver nota alcalce												
Difteria, tétanos y pertusis acelular (DTaP:<7años)			1ra dosis	2da dosis	3ra dosis			◄-----4ta dosis------►				5ta dosis					
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)			1ra dosis	2da dosis	3ra dosis		3ra o 4ta dosis ver nota										
Neumococo Conjugado (PCV13)			1ra dosis	2da dosis	3ra dosis		◄------4ta dosis-----►										
Polio Inactivado (IPV:<18años)			1ra dosis	2da dosis	◄----------3ra dosis ----------►							4ta dosis					
Influenza (IIV) o					Vacunación Anual 1 o 2 dosis									Vacunación Anual 1 dosis			
Influenza (LAIV)											Vacunación Anual 1 o 2 dosis	o		Vacunación anual 1 dosis			
Sarampión Común, Sarampión Alemán, Paperas (MMR)					Ver Nota		◄------1ra dosis-----►					2da dosis					
Varicela (VAR)							◄------1ra dosis-----►					2da dosis					
Hepatitis A (Hep. A)					Ver Nota		◄-------- Serie 2 dosis, ver nota----------►										
Tétanos, difteria, pertusis acelular (Tdap: ≥7años)														Tdap			
Virus Papiloma Humano (HPV)														Ver Nota			
Meningococo -MenACWY -D≥9 meses MenACWY -CRM ≥2 meses			Ver Nota											1ra dosis		2da dosis	
Meningococo B														Ver Nota			
Neumococo polisacarida (PPSV23)											Ver Nota						

Edad recomendada para todos los niños
Edad recomendada para alcanzar a aquellos con vacunación incompleta

Recomendaciones para grupos de alto riesgo
Edad recomendada para decisiones clínicas individuales

No recomendación

RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO, MD, FAANS, FACS
Secretario, Departamento de Salud