

INFÓRMATE SOBRE LOS RIESGOS DE LA XILACINA

La **xilacina**, conocida en Puerto Rico como **anestesia de caballo**, es un sedante veterinario no opiode que **no está aprobado por la FDA** para el consumo humano. Sin embargo, se ha vinculado con un aumento en muertes por sobredosis en Estados Unidos y puede empeorar los efectos potencialmente mortales de los opioides (NIDA, 2023).



NOMBRE COMÚN:




Anestesia de caballo

EFFECTOS SECUNDARIOS:

- Somnolencia (adormecimiento o sueño de mono)
- Visión borrosa
- Amnesia (olvido o deterioro de la memoria)
- Hipotermia (temperatura baja en el cuerpo)
- Disminución del ritmo respiratorio
- Ritmo cardíaco y la presión arterial a niveles peligrosamente bajos

COMPLICACIONES SEVERAS:

- Úlceras en la piel
- Abscesos, infecciones, entre otras complicaciones relacionadas
- Septicemia (contaminación de la sangre)



¿Qué se debe hacer ante una persona con signos y síntomas de una posible sobredosis?

En caso de sospecha de sobredosis con presencia de opioides, es recomendable la administración de **naloxona**.

Se debe alertar a los servicios médicos de emergencias **9-1-1**.



Tel: 787 765 2929, exts. 3777, 3682
email: opioides@salud.pr.gov



ESCANEA Y
OBTÉN MÁS
INFORMACIÓN.



DEPARTAMENTO DE

SALUD

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Fuente:

National Institute on Drug Abuse. (2023). La xilacina. <https://nida.nih.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-xilacina>

Cárdenas Quesada, J., Torrens, M., & Farré, M. (2023). Fentanilos, xilacina y benzodiacepinas: un nuevo riesgo para las emergencias. Emergencias. 35, 397-400. <https://revistaemergencias.org/wp-content/uploads/2023/12/400.pdf>