


Administra naloxona

- 1** Identifique una sobredosis por opioides (use la triada).




- Pupilas contraídas
- Depresión Respiratoria
- Pérdida de conciencia

- 2** Coloque a la persona en posición supina (boca arriba), si es posible.




Administra naloxona

- 3** Abra las vías aéreas (suba la barbilla de la persona).



- 4** Abra el empaque y retire el medicamento. Si tiene dudas, lea las instrucciones del empaque.

- 5** Coloque su dedos como lo indica la imagen:



Administra naloxona

- 6** Introduzca la boquilla del dispositivo en una de las fosas nasales de la persona, hasta que sus dedos rocen la nariz del paciente.



- 7** Administre la Naloxona presionando el émbolo de manera rápida y firme. Bote el dispositivo luego de utilizarlo.

Cuidados básicos

- Coloque a la persona en posición de rescate luego de administrar naloxona.



- Espere 3 minutos para administrar una segunda dosis de naloxona, de ser necesario
- No deje a la persona sola, espere la asistencia médica.

Salva VIDAS...

Reconoce una sobredosis y administra **naloxona**

¿Qué es una sobredosis?

Ocurre cuando se administra o se usa una sustancia en una cantidad mayor a la que el cuerpo puede tolerar. La sobredosis presenta signos y síntomas graves y puede llegar a provocar la muerte de la persona.

Las sobredosis pueden suceder por medicamentos como los opioides o sustancias ilegales, como la heroína y el fentanilo ilegal.

Si usted o alguien está sufriendo una sobredosis, llame inmediatamente al **9-1-1** y siga las instrucciones del profesional.

Reconoce una sobredosis por opioides (legales o ilegales) identificando la tríada:

a. Pupilas contraídas o puntiformes

- i. Sin importar la intensidad de la luz, la pupila permanecerá pequeña o contraída.

b. Depresión Respiratoria

- i. La persona respira lento o no respira.

c. Pérdida de conciencia

- i. La persona no responde si le llaman o le tocan.

Otros signos: cianosis (labios y uñas azules o violetas) y cuerpo flojo.

Manejo de una sobredosis con presencia de fentanilo

Si usted está manejando una sobredosis por fentanilo, debe saber que es poco probable que esta sustancia pueda absorberse a través de la piel. Para prevención, se recomienda no tocarse la nariz o la boca.

Naloxona expirada

Si la naloxona no ha estado expuesta al sol, su efectividad puede extenderse de 2 a 4 años luego de su fecha de expiración.



Naloxona

Es el antídoto de las sobredosis por opioides. Se debe administrar a toda persona que presente signos de sobredosis.

Si se administra y la persona no tenía una sobredosis, la naloxona no le ocasionará daño.

No deje a la persona sola, llame al **9-1-1** y espere a que llegue la asistencia médica.

La Ley 35 en Puerto Rico protege a todos los ciudadanos que, de buena fe, administren naloxona para salvar la vida de una persona.

Comunícate para apoyo a enlace a tratamiento con el Programa de Navegadores para el Manejo de Casos y Referido a Tratamiento (NaPro) al siguiente QrCode:



Educaciones e información
Tel: **787-765-2929, ext. 3777**
Email: **opiodes@salud.pr.gov**



DEPARTAMENTO DE
SALUD
GOBIERNO DE PUERTO RICO