


Viruela símica o MPOX

Clasificación de actividades de riesgo para la transmisión de la viruela símica.



De mayor riesgo: Contacto directo con la erupción infecciosa, costras o fluidos corporales | Contacto sexual o íntimo. El condón puede protegerlo en el área de cobertura. Si tuvo viruela símica, se recomienda el uso de condón hasta 6 semanas luego de la infección.

Riesgoso: Besarse | Acariciarse | Abrazos con contacto piel con piel | Bailar en una fiesta realizada en interiores con aglomeración con personas que no están completamente vestidas.

Posible: Compartir tragos | Compartir la cama, toallas o artículos de higiene personal | Bailar en una fiesta realizada en interiores con aglomeración con personas completamente vestidas

Poco probable: Bailar en una fiesta realizada al aire libre en su mayoría con personas vestidas. | Transmisión entre compañeros de trabajo. | Al medirse ropa. | Tocando cerradura de la puerta. | En el aeropuerto o el avión. | En la piscina, jacuzzi o cuerpo de agua. | En baños o transporte públicos en el supermercado, cafeterías o en el gimnasio.



Si comienza a presentar síntomas o sospecha tenerlos, manténgase en aislamiento y comuníquese con su proveedor de atención médica.

Estigmatizar personas por su estatus de salud no es correcto. Toda persona puede adquirir viruela símica o mpox.

Detén la propagación. | Detén el estigma. | Conoce tu riesgo.



Línea de orientación sobre la viruela símica
787-522-3976 o 939-227-9400 | L-V 8am a 4:30pm

Material adaptado de contenido de @queernation3000 actualizado 07/27/2022