

Viruela símica o MPOX

Alternativas de administración para la vacuna contra la viruela símica.

La vacuna JYNNEOS está aprobada para la prevención de la viruela y la viruela símica. Es la principal vacuna utilizada durante este brote en los Estados Unidos.

Dosis recomendadas para estar protegido

La vacuna JYNNEOS se administra en un esquema de vacunación de dos dosis. Las dos dosis deben ser administradas con un intervalo de 28 días.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la administración de la segunda dosis cuando corresponda. Pero, si no es posible, hágalo tan pronto como pueda; preferiblemente dentro de los 35 días siguientes a la administración de la primera dosis.

Se considera que está vacunado contra la viruela símica 14 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna.



Área de la administración de la vacuna contra la viruela símica

Si es elegible para vacunarse en la piel de su antebrazo, pero prefiere una ubicación más discreta, su proveedor ahora puede administrarle la vacuna inyectable contra la viruela símica ya sea en la piel sobre el omoplato, o en el músculo del hombro llamado deltoides.



Ejemplo de la administración intradérmica en el músculo deltoides.



Ejemplo de la administración intradérmica en la parte superior de la espalda debajo de la escápula.

Recibe las dos dosis de JYNNEOS para estar completamente vacunado contra la viruela símica.



Si comienza a presentar síntomas o sospecha tenerlos, manténgase en aislamiento y comuníquese con su proveedor de atención médica.

Estigmatizar personas por su estatus de salud no es correcto. Cualquier persona puede enfermarse con la viruela símica.