

## ITINERARIO DE VACUNACIÓN RECOMENDADO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 2026

Vacunas	Al nacer	1 mes	2 meses	4 meses	6 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	19-23 meses	2-3 años	4-6 años	7-10 años	11-12 años	13-15 años	16 años	17-18 años			
Virus Respiratorio Sincitial (RSV-mAb [Nirsevimab])	1 dosis dependiendo del estado de vacunación materna contra el VRS (Ver notas)				1 dosis (8-19 m) (Ver notas)															
Hepatitis B (HepB)	1ª dosis	2ª dosis		← 3ª dosis →																
Rotavirus (RV): RV1 (Serie de 2 dosis), RV5 (Serie de 3 dosis)		1ª dosis	2ª dosis	Ver notas																
Difteria, tétanos, pertusis acelular (DTaP: <7yrs)		1ª dosis	2ª dosis	3ª dosis	← 4ª dosis →				5ª dosis											
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)		1ª dosis	2ª dosis	Ver notas	← 3ª o 4ª dosis (Ver notas) →															
Neumococo conjugado (PCV15, PCV20)		1ª dosis	2ª dosis	3ª dosis	4ª dosis															
Polio Inactivado (IPV)		1ª dosis	2ª dosis	← 3ª dosis →						4ª dosis	Ver notas									
COVID-19 (1vCOV-mRNA, 1vCOV-aPS)	Ver notas																			
Influenza (IIV3, ccIIV3)	Vacunación anual 1 o 2 dosis												Vacunación anual 1 dosis							
Influenza (LAIV3)											Vacunación anual 1 o 2 dosis				Vacunación anual 1 dosis					
Sarampión común, Sarampión alemán, Rubeola (MMR)	Ver notas					← 1ª dosis →				2ª dosis										
Varicela (VAR)							← 1ª dosis →				2ª dosis									
Hepatitis A (HepA)	Ver notas					Serie de 2 dosis (Ver notas)														
Tétano, difteria, pertusis acelular (Tdap: ≥7yrs)													1 dosis							
Virus Papiloma Humano (HPV)														Ver notas						
Meningococo (MenACWY-CRM ≥2m, MenACWY-TT ≥2yrs)													Ver notas				1ª dosis		2ª dosis	
Meningococo B (MenB-4C, MenB-FHbp)														Ver Notas						
Virus Respiratorio Sincitial (RSV [Abrysvo])														Administración de temporada durante embarazo (Ver notas)						
Dengue (DEN4CYD; 9-16yrs)														Seropositivo áreas endémicas a Dengue (Ver notas)						
Viruela símica Mpox																				

Edad recomendada para todos los niños
  Edad recomendada para alcanzar aquellos con vacunas incompletas
  Recomendaciones para grupos de alto riesgo
  Vacunación recomendada puede iniciar a esta edad (Ver notas)
  Edad recomendada para decisiones clínicas individuales
  No recomendado