GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Principal Oficial Médico

DEPARTAMENTO DE SALUD

Preguntas frecuentes: Tratamiento para COVID-19 **(Sotrovimab)**

1. ¿Qué es el Sotrovimab?

Es un medicamento en investigación usado para tratar síntomas de leves a moderados de COVID-19 en adultos y niños [12 años o más que pesen al menos 88 libras (40Kg)] con resultado positivo de prueba viral de SARS-COV-2 y que estén en riesgo de progresar los síntomas de COVID-19, incluyendo hospitalización o muerte.

2. ¿Qué le debo informar a mi proveedor de cuidado de salud antes de recibir Sotrovimab?

Debe informarle a su proveedor de cuidado de salud si:

- Tiene cualquier alergia
- Si ha tenido una reacción alérgica seria a Sotrovimab o a cualquiera de sus ingredientes
- Está embarazada o planifica un embarazo
- Esta lactando o planifica lactar
- Tiene cualquier enfermedad seria
- Está tomando cualquier medicamento (prescripción médica, vitaminas, medicamentos que no requieren receta, vitaminas o productos naturales

3. ¿Cuándo y dónde puedo recibir el Sotrovimab?
El Sotrovimab se administra durante los primeros 10 días desde que comienzan los síntomas y es administrado en facilidades hospitalarias o en su hogar por compañías de infusión en caso de ser necesario.

4. ¿Cómo se administra el tratamiento de anticuerpos monoclonales?
Es un procedimiento ambulatorio. Se administra mediante vena (vía intravenosa) por espacio 30 minutos. Luego el paciente se mantiene en observación por espacio de una hora.

5. ¿Embarazadas o madres lactantes pueden utilizar Sotrovimab?
No hay experiencia al tratar mujeres embarazadas o lactantes con Sotrovimab. Para una mujer y un niño sin nacer, los beneficios de recibir Sotrovimab pueden ser mayores que el riesgo del tratamiento. Se recomienda discutir sus opciones y situación específica con tu proveedor de cuidado de salud.

6. ¿Están aprobados estos tratamientos por la FDA?
   La FDA emitió una autorización de uso de emergencia (EUA) para Sotrovimab, para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos (12 años o más de edad y cuyo peso sea de al menos 40 kg) que tengan un resultado positivo de prueba viral SARSCoV-2 y quienes están en alto riesgo de progresar severamente la enfermedad de COVID-19.

7. ¿Si estoy vacunado, no estoy vacunado o no he completado la vacunación puedo recibir el tratamiento de anticuerpos monoclonales?
   Sí, puedo recibir el tratamiento de anticuerpos monoclonales, independientemente el estado de vacunación.

8. ¿El tratamiento de anticuerpo monoclonal Sotrovimab tiene algún costo?
   No, el tratamiento no tiene ningún costo para el paciente.

9. ¿Sotrovimab remplaza la vacunación?
   No, Sotrovimab no remplaza la vacunación contra el COVID-19.

10. ¿Luego de administrar el tratamiento Sotrovimab, cuánto tiempo debo esperar para poder vacunarme o continuar con la siguiente dosis de vacunación?
    Se recomienda esperar 90 días para vacunarse contra el COVID-19.