

Sífilis Congénita

para proveedores de salud

Prevención

- Converse con sus pacientes sobre la salud sexual y factores de riesgo para adquirir sífilis.
- Oriente y promueva el uso de condones.
- Ordene la prueba de sífilis en la primera visita prenatal, en el segundo y tercer trimestre de embarazo y durante el parto. La detección temprana en la persona gestante es una de las formas de prevenir la sífilis congénita.
- Pregúnteles si han sido diagnosticadas con alguna ITS anteriormente.
- Proporcione tratamiento adecuado y oportuno a la persona gestante.



Tratamiento

- La penicilina G benzatina es la única terapia eficaz documentada para la sífilis durante el embarazo. Debe ser administrada al menos **30 días antes del parto** para prevenir la sífilis congénita.
- La gestante deberá ser tratada con el régimen de terapia recomendado según su fase clínica de infección.
- De ser alérgica a la penicilina, la gestante debe ser desensibilizada y tratada con penicilina.



Reporte de sífilis congénita

Reporte todo resultado de laboratorio positivo asociado a sífilis congénita de manera inmediata a la Oficina de Vigilancia ETS (orden administrativa núm. 358).

Fax: (787) 274-5579

Correo postal: Po Box 70184

San Juan, PR 00936-8184



Si tiene alguna duda puede comunicarse con
José I. Colón García, MPH
(787) 765-2929 ext. 3585