

PROGRAMA DE OPIOIDES

ANTÍDOTO PARA LAS SOBREDOSIS POR OPIOIDES

Naloxona es el medicamento que **revierte rápidamente una sobredosis por opioides. La vida media de Naloxona en el organismo es de 30 a 90 minutos.** Pasado este periodo de tiempo los signos y síntomas de sobredosis pueden reaparecer. Aunque existen diferentes marcas comerciales, Naloxona (nombre genérico) también es conocido como Narcan.

¿Cuándo se debe utilizar Naloxona?

Cuando se observen signos y síntomas como pérdida de conciencia, pupilas puntiformes, depresión respiratoria y somnolencia. La resucitación cardiopulmonar toma prioridad sobre la administración de Naloxona.

¿Cómo usar?



Autoinyector

Para usarlo, coloque el extremo negro en la mitad de la parte exterior del muslo de la persona, a través de la ropa si es necesario. Luego, presione el dispositivo firmemente y manténgalo en el lugar durante cinco segundos.



Inyección

Se puede administrar intravenoso, intramuscular y subcutáneo. La dosis recomendada es de 0.4mg/ml. Sin embargo, a veces se necesita una segunda dosis de 0.4mg/ml si la primera dosis no revierte la sobredosis ni restablece la respiración.



Vaporizador Nasal

Sostenga el dispositivo con el pulgar en la parte inferior y con el dedo índice y el dedo mayor a cada lado de la boquilla. Inserte suavemente el dispositivo dentro de una fosa nasal. Presione el émbolo con firmeza para rociar toda la dosis de Narcan dentro de una fosa nasal. No es necesario aplicar el aerosol en ambas fosas nasales.

Material Informativo

Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo

Proyecto *Overdose Data to Action*

Para más información: 787-765-2929

ext. 3125, 3777, 3778, 4434

Email: opioides@salud.pr.gov

Salva una Vida



Reporta la Sobredosis

Referencia:

NIDA. 2019. Naloxona. DrugFacts.

<https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/naloxona>

Este folleto no pretende diagnosticar condición alguna de salud. El mismo es para uso informativo.

DEPARTAMENTO DE
SALUD

